

Výtěr z uretry

Kultivační vyšetření umožňuje zjistit původce uretritidy. Nejčastějším bakteriálním původcem uretritidy je *Neisseria gonorrhoeae*, méně často pneumokoky a hemofily.

Zkratka:	Ur – výtěr z uretry		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl. 541	
Materiál:	výtěr z uretry		
Odběrová souprava:	sterilní tampon na drátku v transportním médiu Amies		
Pokyny k odběru:	U muže se steril. tampon zavede do uretry do hloubky 2 – 4 cm, rotačním pohybem provést odběr a vložit do transportního média U ženy se odběr provádí cca 1 hodinu po vymočení. Sterilní tampon se zavede do uretry a po odběru se vloží do transportního média.		
Četnost (odezva):	negat. výsledek - 2 dny pozit. výsledek - 2 - 7 dnů	Zpracováno:	denně
Transport:	2 hod. pokojová teplota, 24 hod. pokojová teplota		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 24 hod.	Teplota: pokojová teplota	
Vykazování pro pojišťovnu:	Výkon-kód základní: 82 011, 82 025		
SOP číslo – název:	SOP-PLO-OKM-122 – Kultivační vyšetření vzorků z urogenitálního traktu		
Indikace:	Urethritis.		
Interpretace:	Hlavní původce: Neisseria gonorrhoeae Při interpretaci je nutné odlišit nález kolonizujících nebo kontaminujících bakterií (gramnegativní tyčinky, koaguláza negat. stafylokoky, enterokoky, kvasinky).		
Poznámka:	Při vyšetření uretritidy doplnit vyšetření na Chlamydia trachomatis a urogenitání mykoplasmata.		